

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

STATION CHAMPAGNE-ARDENNE

Départements : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne



Ministère de l'Agriculture
Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt
Service Régional de la Protection des Végétaux
62, avenue Nationale - La Neuville
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone : 26.09.06.43

PUBLICATION PÉRIODIQUE
Abonnement annuel :

170 F.

ÉDITION - GRANDES CULTURES

ISSN 0295-5776

- 1 -

BULLETIN n° 27 du 8 OCTOBRE 1987

COLZA : GROSSE ALTISE : très rares captures. Fin de risque.
MOUCHE DU CHOU : situation.
PUCERONS : régression nette des populations.

ORGE : PUCERONS : surveiller.

COLZA

Végétation très poussante. Les stades varient de 6-7 feuilles pour les premiers semis à 1-2 feuilles pour les semis du 15 septembre.

GROSSE ALTISE

Situation :

De très rares captures ont été enregistrées ces dix derniers jours :

Lieu	Stade	Date des captures	Nbre de captures
Villery (10)	5 feuilles	2/10	1
Chamoy (10)	4 feuilles	3/10	2
Lenharrée 51	3 feuilles	4/10	1
Dammartin/Meuse 52	3 feuilles	2/10	1

Dans tous les autres secteurs de la région, aucune capture.

Préconisation :

Les captures ont été très faibles dans l'ensemble et les cultures ont dépassé le stade sensible de 2 feuilles vraies.

Une intervention n'est plus justifiée.

MOUCHE DU CHOU

Situation :

Aucun symptôme apparent n'est visible à l'heure actuelle. Cependant, on constate les premiers dégâts dans quelques secteurs de l'Aube et de la Haute-Marne.

Situation au 5 octobre :

Lieu	Stade	% de pieds touchés
Chaource (10)	5 feuilles	32
Pargues (10)	5 feuilles	16
Bar/Seine (10)	6 feuilles	32
Prugny (10)	7 feuilles	16
Vaudremont (52)	6 feuilles	52
Richebourg (52)	6 feuilles	0
Leffonds (52)	6 feuilles	30
Blumeray (52)	5 feuilles	4

7.2.28
... ..

Préconisation :

Les traitements par pulvérisation contre les adultes ne sont pas efficaces.

Seul l'emploi des microgranulés, dans les zones à risque, appliqués en localisation dans la raie du semis permet une bonne protection.

PUCERONS

Situation :

Les conditions climatiques ont fait chuter les populations de pucerons verts.

Quelques pucerons cendrés sont encore présents.

Préconisation :

Ne plus intervenir.

ORGE

JAUNISSE NANISANTE

Situation :

Les maïs arrivent à maturité et certains ont gelé la semaine dernière ce qui provoque une migration des pucerons sur les repousses de céréales où ils se contaminent en virus.

Préconisation :

Attention aux premiers semis les plus exposés à la jaunisse nanisante.

Il est encore trop tôt pour indiquer si les pucerons sont virulifères ou non.

Compte tenu du délai relativement long demandé pour les tests pucerons, le pouvoir virulifère de ces ravageurs risque d'être connu après le seuil d'intervention (à partir du stade 1 ou 2 feuilles si 15 % des plantes portent des pucerons).

En conséquence, il y aura lieu d'assurer un traitement dès la présence de colonies sur les jeunes céréales.

Produits : rien de bien nouveau depuis la campagne 1986-87.

Matière active	Dose/ha de m.a.	Spécialités Commerciales	Dose/ha de S.C.
alphanéthrine	10 g	FASTAC (AGRISHELL)	0,2 1
bifenthrine	7,5g	TALSTAR (PEPRO)	0,075 1
bromophos	375 g	Diverses spécialités	
cyfluthrine	15 g	BAYTHROID (BAYER)	0,3 1
cyperméthrine	20 g/l	Diverses spécialités	
deltaméthrine	7,5g	DECIS (PROCIDA)	0,3 1
fenvalerate	25 g	SUMICIDIN 10 (AGRISHELL)	0,25 1
fluvalinate	48 g	MAVRIK (SANDOZ)	0,2 1
cyhalothrine	7,5g	KARATE (SOPRA)	0,15 1

TELEMATIQUE : 36.15 tapez CLACMAG